

VERHALTEN UND MEDIKAMENTE NACH DER OPERATION

Allgemeine Hinweise

Bis die Wirkung einer Anästhesie vorüber ist, vergehen zirka 24 Stunden. Zu Ihrer persönlichen Sicherheit sollten Sie in dieser Zeit

- **Kein Fahrzeug führen**
- **Keinen Alkohol trinken**

Sollten nach der Operation zu Hause Probleme auftreten, die im Zusammenhang mit der Anästhesie stehen oder sollten Sie starke Schmerzen haben, rufen Sie uns an. Wir sind während 24 Stunden durchgehend erreichbar.

Arzt	Praxis	Mobile	Privat
Anästhesiearzt			
<input type="checkbox"/>	Dr. Ness		076 575 35 31
<input type="checkbox"/>	Dr. Gördes		079 255 76 55
<input type="checkbox"/>	Dr. Slavei		076 349 62 04
<input type="checkbox"/>	Dr. Tulassay		077 401 98 24
<input type="checkbox"/>	Dr. Bichman		076 778 62 21
Operateur:			
<input type="checkbox"/>	Dr. Bignion	031 381 51 21	079 564 64 63
<input type="checkbox"/>	Dr. Müller	031 311 05 61	031 300 88 11 (Lindenhofspital)

Schmerzen	<input type="checkbox"/> Co-Dafalgan Brausetbl. alle 6 Stunden für 24 Stunden <input type="checkbox"/> Dafalgan Tbl. à 500mg / 1g alle 6 Stunden für 24 Stunden <input type="checkbox"/> eigene	<input type="checkbox"/> Brufen Tbl. à 600mg alle 12 Stunden für 24 Stunden <input type="checkbox"/> 1 / 2 Novalgin Tbl. à 0.5 g alle 6 - 8 Stunden für 24 Stunden <input type="checkbox"/>
Eigene Medikamente	<input type="checkbox"/> weiter wie bisher	<input type="checkbox"/>
Verband	<input type="checkbox"/> entfernen nach 3 Tagen, danach nur noch mit Pflaster verbinden	<input type="checkbox"/> belassen bis zur Nachkontrolle beim Hausarzt in _____ Tagen.
Fäden entfernen	<input type="checkbox"/> in 10 / 12 / 14 Tagen beim Hausarzt oder Praxis	
Weitere Verordnungen	<input type="checkbox"/> Finger gut bewegen: biegen und strecken <input type="checkbox"/> Hochlagern <input type="checkbox"/> Nachkontrolle Praxis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	